

Смртност од ковида-19 пала је за трећину од априла захваљујући побољшаном лечењу, кажу научници са Здравственог института који делује у склопу Универзитета у Вашингтону.



У САД је смртност заражених ковидом-19 око 0,6 одсто што је пад у односу на око 0,9 одсто на почетку пандемије, каже директор института ИХМЕ (Институте фор Хеалтх Метрицс анд Евалуатион) др Кристофер Мареј.

Статистике показују да су лекари пронашли боље начине за бригу о оболелима, што укључује терапије кисеоником и антикоагулансима, лековима за спречавање згрушавања крви и настанка крвних угрушака.

Као ефикасна терапија спомиње се и генерички стероид дексаметазон.

Стручњацима је тешко да тачно измере стопу смртности у пандемији, односно проценат људи инфицираних вирусом код којих ће болест имати смртни исход.

Тешкоћу повећава и чињеница да многи инфицирани људи немају симптоме и нису били идентификовани.

"Знамо да је ризик у тесној вези с годинама оболелих. За сваку годину живота, ризик смртности повећава се за девет одсто", објаснио је др Мареј.

Институт из Сиетла, утицајан извор за предвиђања побезана са ковидон-19, објавио је да је смртност изазвана том болешћу већа у заједницама са високим процентом гојазних особа.

ИХМЕ је објавио да је анализа података о смртним исходима оболелих од ковида-19 на основу 300 студија показала пад од 30 одсто у односу на период март-април 2020.

Упркос том позитивном тренду, проценат заражености и хоспитализација повећао се у САД последњих неколико недеља.

(Хина, Ројтерс)